



Pierre Fabre

# P R I X A . F . P . B .

ASSOCIATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE BIOLOGIQUE

## Etude des dérèglements neurobiologiques ou comportementaux associés à des affections psychiatriques



Prix de 50 000 F.

décerné pour récompenser un travail individuel  
ou collectif de recherche en psychiatrie biologique

### LES ACTES DE CANDIDATURE devront être adressés :

- avant le 10 septembre 1996
- au Dr Jean-Christophe CARRARO - Département Pierre Fabre Psychiatrie  
PIERRE FABRE MEDICAMENT - La Chartreuse - 81106 Castres Cedex - Tél. 63 71 43 04

### LE JURY

sera composé des membres du Conseil d'administration de l'A.F.P.B.  
et présidé par J. DALERY et M. BRILEY.

### LE DOSSIER

- devra être déposé en triple exemplaire
- devra comporter :
  - un curriculum vitae du candidat (ou une présentation de l'équipe du candidat)
  - le travail original ou l'ensemble des publications justifiant la candidature  
(dans les 2 cas il doit s'agir d'un document spécifique conçu et rédigé en vue de l'obtention de ce prix).
  - Un résumé (en quelques lignes).

# ÉTATS DÉPRESSIFS MAJEURS



## Le fil rouge pour sortir de la dépression

**Composition - présentation :** Boîte de 30 comprimés enrobés, dosés à 12,5 mg de tianeptine (sel de sodium). **Propriétés :** Antidépresseur. *Chez l'animal*, la tianeptine augmente l'activité spontanée des cellules pyramidales de l'hippocampe et en accélère la récupération. *Chez l'homme*, Stablone se caractérise par une activité : - sur les troubles de l'humeur ; - sur les plaintes somatiques liées à l'anxiété et aux troubles de l'humeur ; - sur les troubles du comportement de l'éthylisme en période de sevrage. Stablone est dépourvu d'effet : - sur le sommeil et la vigilance ; - sur le système cardiovasculaire ; - sur le système cholinergique.

**Indications thérapeutiques :** Épisodes dépressifs majeurs

- c'est-à-dire caractérisés : Stablone est préconisé dans les états dépressifs d'intensité légère, modérée ou sévère. **Contre-indications :** Enfants de moins de 15 ans, IMAO, grossesse, allaitement. **Précautions d'emploi :** Par principe, surveillance attentive en début de traitement (risque suicidaire inhérent aux états dépressifs), précaution en cas d'anesthésie, information des conducteurs de machine d'un risque potentiel (cf. VIDAL), réduction progressive de la posologie à l'arrêt du traitement. **Interactions médicamenteuses :** IMAO. **Effets indésirables :** Rares, généralement bénins : - gastralgies, douleurs abdominales, bouche sèche, anorexie, nausées, vomissements, constipation, flatulences, - insomnie, somnolence, cauchemars, asthénie,

- tachycardie, extrasystoles, précordialgies, - vertiges, céphalées, lipothymies, tremblements, bouffées de chaleur, - gêne respiratoire, boule dans la gorge, - gènes, lombalgies. **Posologie et mode d'administration :** 3 comprimés par jour, matin, midi et soir. Chez l'adulte, cirrhotique ou non, aucune modification posologique n'est nécessaire. Chez les sujets de plus de 65 ans et en cas d'insuffisance rénale, 2 comprimés par jour. C.T.J. de 4,81 F à 7,22 F. Liste I. Al. 329.339.1. Prix : 72,20 F. Remb. Séc. soc. 65%.

lect. Information médicale : ARDIX Médical - 33 Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : (1) 46 41 6 Les Laboratoires Servier - 22, rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine. Pour plus d'informations se reporter au