

Research:
for someone with epilepsy
it's another word for hope.

- More than 280,000 Canadians have epilepsy.
- 14,000 new cases are reported every year - over half in children under 10 years old.
- In most cases, we still don't know the cause.

Research will help us find a cure for epilepsy. You too can help.



Send donations to:
Epilepsy Canada
1470 Peel St., Suite 745
Mtl., Qc H3A 1T1
(514) 845-7855



ÉPILEPSIE

**Lorsque l'objectif
thérapeutique est
la maîtrise complète
des crises**

**Maîtrise complète des crises
chez un pourcentage
impressionnant de patients¹**

**Frisium est « un antiépileptique
remarquablement efficace et
[généralement] sûr d'emploi
lorsqu'il est ajouté au traitement »¹**

**Efficace contre tous les types
de crises, tant chez les adultes
que chez les enfants²**

**Prise quotidienne,
de préférence au coucher[†]**

LARGE SPECTRE D'ACTION



R Frisium[®] (clobazam)

Une fois par jour[†]

[†] La dose quotidienne peut être fractionnée chez certains patients.

Frisium est indiqué comme traitement d'appoint chez les patients épileptiques dont l'état n'est pas maîtrisé de façon satisfaisante par le traitement antiépileptique utilisé. À l'instar des autres benzodiazépines, le clobazam doit être administré avec prudence aux patients, notamment aux personnes âgées. Les effets indésirables les plus fréquents (>1 %) comprennent la somnolence, les étourdissements, la fatigue, l'ataxie, le gain pondéral, la nervosité, les troubles du comportement, l'hostilité et la vision brouillée.

Hoechst Marion Roussel

Hoechst Marion Roussel Canada Inc.,
Laval (Québec) H7L 4A8
Une société du Groupe Hoechst


Hoechst 

©Marque déposée de Hoechst AG,
Allemagne, utilisée sous licence par
Hoechst Marion Roussel Canada Inc.,
Laval (Québec) H7L 4A8.

CCPP ACIM FRI 96012 F

Pour documentation voir page xli.

Introducing MIGRANAL Nasal Spray



A 5-HT₁ agonist that starts fast and offers long-lasting relief from migraine

5-HT₁ agonist therapy

- MIGRANAL relieves migraine headaches and associated symptoms¹
- Nasal administration bypasses the GI tract

Fast onset of relief

- Can be taken at any stage of the migraine^{1,‡}
- Clinical response begins within 30 minutes¹
- MIGRANAL relieved up to 70% of migraines at 4 hours (n=105)^{2,†}

Long-lasting relief^{††}

- Long half-life: 10 hours¹
- 85% of responders had no return of migraine within 24 hours after taking MIGRANAL (n=73)²
- Therefore, MIGRANAL may help avoid the need for repeated dosing, rescue medication, and the associated costs.

Generally well-tolerated in clinical trials¹

- Most common adverse events were transient and self-limiting, and may be attributable to the route of administration^{2,3}: Rhinitis (25% incidence) reported as rhinitis, rhinorrhea, nasal/nose congestion, dryness, edema and excessive sneezing; other side effects observed included: nausea (9%), taste disturbance (7%) and vomiting (4%).

◇ For best results, treatment should be initiated at the first sign/symptom of a migraine attack.

† Relief = from moderate/severe pain to mild/no pain

†† Up to 24 hours with a single 2 mg dose

MIGRANAL is contraindicated in patients predisposed to vasospastic reactions. Please see Prescribing Information for more details.



MIGRANAL
(dihydroergotamine mesylate nasal spray)
Fast migraine relief that lasts

PAAB MEMBER (PMAC)

*Registered trademark

MIG-96-10-3531E

SANDOZ

SANDOZ CANADA INC.
Dorval, Québec H9R 4P5

For brief prescribing information see pages xxxi, xxxii
<https://doi.org/10.1017/S031716710021776> Published online by Cambridge University Press