

ACTA NEUROPSYCHIATRICA

OFFICIEEL WETENSCHAPPELIJK ORGAAN VAN HET I G B P
(INTERDISCIPLINAIR GENOOTSCHAP VOOR BIOLOGISCHE PSYCHIATRIE)

6^e JAARGANG NUMMER 1 - MAART 1994

Gedragsneurologie versus biologische psychiatrie: intellectuele ontstaansgeschiedenis van
hun positie binnen de neuropsychiatrie

Deel I. Academische neuropsychiatrie versus instellingenpsychiatrie
in de tweede helft van de 19de eeuw

W. van den Bergh

Biologische aspecten van de paniekstoornis

L. Timmerman

Celwetenschap en de psychiater

A. de Jong, K.A. Kroon, A.J.M. Loonen

TEGRETOL C.R.

CARBAMAZEPINE

D I V I T A B S




HERSTELT HET EVENWICHT BIJ MANISCH DEPRESSIEVEN

Samenstelling en toedieningsvormen Tegretol tabletten 100 en 200 mg, siroopvorm en deelbare tabletten met geregleerde afgifte 200 en 400 mg; deze tabletten noemt men Tegretol CR Divitabs. De werkzame stof is carbamazepine. **Indicaties:** Epilepsie Partiele aanvallen: - met een gecompliceerde symptomatologie; met eenvoudige symptomatologie. Gegeneraliseerde aanvallen met een tonisch-clonische component (grand mal) (hetzij tengevolge van primaire gegeneraliseerde epilepsie of, -althans ten dele- tengevolge van secundaire gegeneraliseerde epilepsie). Gemengde epilepsievormen. Psychische veranderingen, die samenhangen met de epilepsie-onafhankelijke van het aanvalstyp. Bij petit mal moeten bovendien ook nog andere geneesmiddelen worden voorgeschreven om absences te onderdrukken. Psychische symptomen, hetzij alleen zulke als algemene geestelijke traagheid of ontstemmingen, dan wel andere psychische stoornissen, verbonden aan niet-specifieke EEG veranderingen. De behandeling van manie bij manisch-depressieve ziekten. De behandeling van Diabetes Insipidus. De behandeling van Alcoholverslaving. De behandeling van Trigeminaal neuralgie. **Contra-indicaties** Overgevoeligheid voor carbamazepine. Atrioventriculaire block. **Waarschuwingen en voorzorgen** Indien er huiduitslag optreedt (zoals roodheid, blaasjes en jeuk) moet de therapie met carbamazepine worden gestaakt. Bij het optreden van leukopenie of leukopenie, die gepaard gaat met klinische symptomen, zoals koorts of keelpijn, en in geval van trombocytopenie, of indien uit tests een verslechtering van de leverfuncties blijkt, moet de therapie met carbamazepine worden gestaakt. Abrupt staken van de behandeling met carbamazepine dient te worden vermeden. Bij patiënten met verminderde nier- of leverfunctie en/of met ernstige ziekten van hart en vaten en bij

oudere patiënten dient voorzichtig te worden gedoseerd. **Bijwerkingen** Soms komen er, vooral aan het begin van de behandeling, bijwerkingen voor, zoals verlies van eetlust, droge mond, misselijkheid, diarree of verstopping, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, veranderingen in het waarnemingsvermogen, of -l oudere patiënten- verwarring en opwinding. Deze bijwerkingen verdwijnen echter meestal na zeven tot veertien dagen, hetzij spontaan, hetzij na een tijdelijke vermindering van de doses. Soms treedt huiduitslag (roodheid, blaasjes, jeuk) op. **Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding** Indien een met Tegretol behandelde patiënte zwanger wordt, moet zij haar arts raadplegen over de verdere therapie. De werkzame stof carbamazepine gaat in de moedermelk over, maar in lagere concentraties dan die waarin het carbamazepine in het bloed van de moeder voorkomt. Moeders die Tegretol gebruiken mogen hun zuigelingen borstvoeding geven. **Interacties** Er treden wisselwerkingen op tussen Tegretol en coëmorin anticoagulantia, orale anticonceptiva, theofylline, valproaat, fenytoïne, fenobarbital, doxycycline, primidon, isoniazide, erythromycine, dextropropoxyfeen, ethosuximide, alcohol en Lithium. **Dosering** Het begin van de therapie strekt het tot aanbeveling de dosis geleidelijk te laten toenemen. Dit kan een paar weken duren en het optimale effect zal na die periode te merken zijn. **Wijze van gebruik** onderhoudsdosering wordt in twee tot drie porties per dag tijdens of na een maaltijd met vloeistoffen ingenomen. **Verpakkingsvorm** Tegretol tabletten met breukgleuf 100 mg à 30 stuks, en 200 mg à stuks, Tegretol siroop à 100 mg/5 ml; flacon à 250 ml, Tegretol CR divitabs 200 mg met breukgleuf à stuks en Tegretol CR divitabs 400 mg met breukgleuf à 60 stuks. Literatuur op aanvraag verkrijgbaar

GEIGY

INTERDISCIPLINARY SOCIETY OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY



**ACTA
NEURO-
PSYCHIATRICA**

ACTA NEUROPSYCHIATRICA

OFFICIAL SCIENTIFIC ORGAN OF THE IGBP
(INTERDISCIPLINARY SOCIETY OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY)

VOLUME 6 NUMBER 1 - MARCH 1994

CONTENTS

From the editor

From the board

- Behavioral neurology versus biological psychiatry: intellectual origins of their position within neuropsychiatry. 1
Part I. Academic neuropsychiatry versus alienistic psychiatry in the late 19th century.
W. van den Bergh
- Biological aspects of panic disorder 6
L. Timmerman
- Molecular biology and neuropsychiatry 12
A. de Jong, K.A. Kroon, A.J.M. Loonen

ACTA NEUROPSYCHIATRICA

Officieel orgaan van het Interdisciplinair Genootschap voor Biologische Psychiatrie

ISSN 0924-2708
Reed HealthCare
Van de Sande Bakhuyzenstraat 4,
1061 AG Amsterdam.
Postadres: Postbus 1126, 1000 BC Amsterdam.
Tel.: 31 -(0)20-5153356.
Fax: 31 -(0)20-5153354.

Redactie
Prof.dr. A.R. Cools
Dr. H.J.A. De Cuyper
Prof.dr. H.A.H. D'haenen
Prof.dr. J. Korf
Prof.dr. H.M. van Praag

Eindredactie
Dr. M.J.A.J.M. Hoes

Redactiesecretaris
Mw. S.J.M. Wernars

Redactiesecretariaat
Mw. P.J. Soer
Postbus 1126,
1000 BC Amsterdam.
Tel.: 31 -(0)20-5153351.
Fax: 31 -(0)20-5153354.

Advertenties: Voor alle inlichtingen;
Reed HealthCare
Postadres: Postbus 1126,
1000 BC Amsterdam.
Tel.: 31 -(0)20-5153350.

Abonnementen: Kunnen ieder moment worden aange-
gaan voor minimaal één jaar en worden stilzwijgend
telkens voor een jaar verlengd, indien niet minimaal zes
weken voor afloop een opzegging is ontvangen.
Voor Nederland f 60,- incl. BTW.
Voor België Bfrs. 1500,- p.a.; psychiaters in opleiding
Bfrs. 1000,-.
Leden van het IGBP en psychiaters in opleiding ontvan-
gen Acta Neuropsychiatria gratis.
Overige landen US \$ 30,- p.a. + verzendkosten.
Abonnementsgeld overmaken naar giro 4368301, ten
name van Reed HealthCare, Van de Sande Bakhuyzen-
straat 4, 1061 AG Amsterdam.

Losse nummers: f 20,- per stuk excl. BTW en verzend-
kosten.
Frequentie 4x per jaar.

Copyright: **Reed HealthCare**
A member of the Reed Elsevier group

Niets uit deze uitgave mag worden gefotocopiëerd en/of verveelvou-
digd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Acta Neuropsychiatria is het officiële orgaan van het
Interdisciplinair Genootschap voor Biologische Psy-
chiatrie (IGBP).

Redactie-adviesraad
Prof.dr. H. Van Den Berghe, Leuven
Prof.dr. B. Bohus, Haren
Prof.dr. R.J. van den Bosch, Groningen
Prof.dr. C.H.M. Brunia, Tilburg
Prof.dr. E.J. Colon, Poortugaal
Prof.dr. P. Cosyns, Edegem
Dr. M. Danhof, Leiden
Dr. M.P. Derde, Brussel
Prof.dr. J. Godderis, Leuven
Dr. W.P. Haaijman, Lent
Prof.dr. R.H. van den Hoofdakker, Groningen
Dr. C. Hooijer, Amsterdam
Prof.dr. B. Van Houdenhove, Leuven
Prof.dr. J. Jolles, Maastricht
Prof.dr. L. Kaufman, Brussel
Drs. G.A.S. Koster van Groos, Rosmalen
Prof.dr. M. Kuilman, Utrecht
Dr. A.J.M. Loonen, Vught
Prof.em.dr. A. Lowenthal, Antwerpen
Dr. P. Moleman, Rotterdam
Prof.dr. M. Niermeyer, Rotterdam
Prof.em.dr. R. Nieuwenhuys, Abcoude
Dr. W.A. Nolen, Utrecht
Prof.dr. S.J. Nijdam, Milsbeek
Prof.dr. J. Peuskens, Kortenberg
Prof.dr. J.M. van Ree, Utrecht
Prof.dr. J. De Roeck, Edegem
Dr. C.J. Slooff, Groningen
Prof.dr. E. Thierry, Gent
Prof.dr. F. Tilders, Amsterdam
Prof.dr. D.H.G. Versteeg, Utrecht
Dr. T.B. Vree, Nijmegen
Dr. H.G.M. Westenberg, Utrecht
Dr. T.A.C.M. van Woerkom, Den Haag

Acta Neuropsychiatria is opgenomen in Excerpta Medica database EMBASE en het Institute for Scientific
Information®: NEUROSCIENCE CITATION INDEX™ en RESEARCH ALERT™.